



Варикозная Болезнь Вен Нижних Конечностей, Осложнённая Острым Тромбофлебитом: Ретроспективный Анализ Клинико-Анамнестических Факторов

Равшанов Шерхонбек Улугбекович- резидент магистратуры первого года обучения Кафедры хирургических болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, г.Самарканд, Узбекистан.

Рузибоев Санжар Абдусаломович - доцент кафедры Хирургические болезни №2 Самаркандского государственного медицинского университета, г.Самарканд, Узбекистан.

<https://orcid.org/0009-0001-2684-8785>

ABSTRACT

Варикозная болезнь вен нижних конечностей является одним из наиболее распространённых заболеваний венозной системы и нередко осложняется развитием острого тромбофлебита поверхностных вен, что существенно утяжеляет клиническое течение заболевания и повышает риск тромбоэмбологических осложнений. Изучение клинико-анамнестических факторов и сопутствующей патологии у данной категории больных имеет важное значение для своевременного выявления пациентов группы высокого риска и оптимизации лечебной тактики.

ARTICLE INFO

Received: 21th October 2025

Accepted: 20th November 2025

KEY WORDS: Варикозная болезнь

Введение: Варикозная болезнь вен нижних конечностей является одним из наиболее распространённых заболеваний венозной системы и нередко осложняется развитием острого тромбофлебита поверхностных вен, что существенно утяжеляет клиническое течение заболевания и повышает риск тромбоэмбологических осложнений. Изучение клинико-анамнестических факторов и сопутствующей патологии у данной категории больных имеет важное значение для своевременного выявления пациентов группы высокого риска и оптимизации лечебной тактики.

Цель: Оценить клинико-анамнестические особенности, структуру факторов риска и распространённость сопутствующей патологии у больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей, осложнённой острым тромбофлебитом.

Методы исследования: Проведён ретроспективный одномоментный анализ медицинской документации 40 больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей, осложнённой острым тромбофлебитом, находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении № 1 клиники Самаркандского государственного медицинского университета. Оценивались возраст и пол пациентов, длительность варикозной болезни, наличие хронической венозной недостаточности, факторы риска тромбофлебита, сопутствующая соматическая патология, а также данные

ультразвукового дуплексного сканирования вен нижних конечностей. Статистическая обработка носила описательный характер.

Полученные результаты: Средний возраст больных составил $52,6 \pm 9,4$ года, женщины преобладали (65,0%). Длительность варикозной болезни более 5 лет отмечалась у 77,5% пациентов. Сочетание двух и более факторов риска выявлено у 72,5% больных. Сопутствующая соматическая патология зарегистрирована у 82,5% пациентов, наиболее часто — артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и ожирение. По данным ультразвукового исследования в 75,0% случаев поражалась большая подкожная вена, признаки венозной гипертензии и клапанной недостаточности выявлены у 80,0% больных.

Выводы: Острый тромбофлебит при варикозной болезни вен нижних конечностей формируется преимущественно на фоне длительного течения заболевания и сочетания нескольких факторов риска. Высокая распространённость сопутствующей соматической патологии подчёркивает необходимость комплексной клинико-анамнестической оценки пациентов для раннего выявления группы высокого риска и оптимизации лечебной тактики.

Список Литературы

1. Шукрова, Сурайё Максудовна. "ХОЛОВ САЙФУДДИН САЙФУЛЛОЕВИЧ."